

<便秘薬>

越後毒消丸

780丸

△【使用上の注意】

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- 2.大量に服用しないこと



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)次の症状のある人。はげしい腹痛、悪心・嘔吐
 - (4)次の診断を受けた人。腎臓病
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2)1週間位服用しても症状がよくなる場合
- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下剤



古田薬品工業株式会社

新潟県燕市吉田東栄町8番11号

お客様相談室 電話0256(93)3171



PP

【成分（60丸中）】

イ	オ	ウ	1.5g
炭酸	マグネシウム	2.0g	
サン	シ	シ	末0.11g

添加物として、アルファー化デンプン、
パレイシヨデンプンを含有しています。

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和
頭重、のぼせ、肌あれ、食欲不振、
腹部膨満、腸内異常発酵、痔、吹出物

【用法・用量】

次の用量を食前又は食間に服用する。
ただし、初回は最小量を用い、便秘の具合や状態を
みながら少しずつ増量又は、減量すること。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	10～20丸	3回
11才以上15才未満	7～13丸	
7才以上11才未満	5～10丸	
7才未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に
密封して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になっ
たり品質が変わる。）