

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

〈鎮痙消炎薬〉

きりきず・すりきず

メントム

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。
- (6) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

切傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、そり傷

用法・用量

適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) お子さまに使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。

成分とはたらき

淡い黄色の軟膏剤で、1g中に次の成分を含有しています。

成 分	分量(1g中)	はたらき
サリチル酸メチル	20mg	皮膚から直接吸収され、はれ・痛みをやわらげます。
dl-カンフル	30mg	皮膚に冷感を与え、おだやかな刺激と軽い麻痺作用を残しますので、傷口のかゆみ・痛みをおさえます。
l-メントール	15mg	
塩酸クロロヘキシジン	2mg	殺菌作用があり、傷口の感染を予防します。

添加物として、ワセリン、黄色4号(タートラジン)、セレシンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

吉田薬品工業株式会社 お客様相談室

電話0256(93)3171(代表) 受付時間: 9時から17時まで (土,日,祝日を除く)

発 売 元

白石薬品株式会社

大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元

吉田薬品工業株式会社

新潟県燕市吉田東栄町8番11号