

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 化膿性皮膚疾患用剤

# とびひ・にきびに **ベナリン®-B**

ベナリン-Bは、サルファ剤の一つであるスルファジアジンをはじめ、抗ヒスタミン剤などを配合した軟膏剤です。吸水作用のあるマクロゴール基剤を使用していますので、特に患部がジクジクした湿性の化膿性皮膚疾患に適しています。

### 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 患部が広範囲の人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
  - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

#### (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

#### (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

化膿性疾患、とびひ、面ちょう、にきび

## 用法・用量

患部に塗布又はガーゼにのばして貼布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用してください。

## 成分とはたらき

白色の軟膏剤で、100g中に次の成分を含有しています。

成分	分量(100g中)	はたらき
スルファジアジン	5g	サルファ剤の一つで、抗菌作用により、化膿を防ぎます。
ジフェンヒドラミン	1g	皮膚から吸収されやすい抗ヒスタミン剤で、かゆみをしずめます。
塩酸ピリドキシン	0.1g	抗炎症作用があり、皮膚の炎症をやわらげます。
ビタミンA油 (1,000,000IU./g含有)	1g	皮膚組織の再生を促進します。
酸化亜鉛	5g	収れん・保護・消炎作用があり、患部を乾燥させ、分泌をおさえます。

添加物としてマクロゴール（基剤）を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。また、一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く使用してください。

### お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様相談室 電話0256(93)3171(代表) 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



**吉田薬品工業株式会社**

新潟県燕市吉田東栄町8番11号