

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

〈せき止め薬〉

せき・たんに

コデスミン[®]

コデスミンは、強力な鎮咳成分リン酸ジドロコデインを中心に『せき』をしずめ、『たん』を取り去る各種成分を配合しています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の用量を食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大 人(15才以上)	3 錠	3 回
11才以上15才未満	2 錠	
8才以上11才未満	1 錠半	
5才以上8才未満	1 錠	
5才未満の乳幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。
- (3)分割服用がしやすいように、錠剤に割線がついていますので、半分に分割するときは、割線にそって錠剤を割ってください。

成分とはたらき

灰白色の割線のある錠剤で、9錠(大人1日服用量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分量(9錠中)	はたらき
リン酸ジヒドロコデイン	30 mg	せきの中枢にはたらい、せきをしずめます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	75 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
キキョウエキス (キキョウとして)	250 mg (1,000 mg)	たんの切れをよくして、出しやすくします。
マレイン酸クロルフェニラミン	6 mg	アレルギー性のせきに効果があります。
無水カフェイン	150 mg	ねむけをおさえます。

添加物として、無水ケイ酸、バレイシヨアンブ、乳糖、セルロース、硬化油、ショ糖脂肪酸エステルを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。また、一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

その他

本品は生薬エキス(キキョウエキス)を配合した製品ですので、製品により錠剤の色調が多少異なることがあります。品質・効果には変わりありません。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様相談室 電話0256(93)3171(代表) 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **吉田薬品工業株式会社**
新潟県燕市吉田東栄町8番11号

◎EZFO1