

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

<せき止め薬>

せき・たんに

コデスミン[®] せき止め液

コデスミンせき止め液は、強力な鎮咳成分リン酸ジヒドロコデインを中心に『せき』をしずめ、『たん』を取り去る各種成分を配合した内服液剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
3. 過量服用・長期連用しないでください
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん

用法・用量

下記の用量を毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。
また場合によっては、4時間おきに1日6回まで服用することができます。
(添付の計量カップをご使用ください。)

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大 人(15才以上)	10ml	3 回
8才以上15才未満	5ml	
5才以上8才未満	3ml	
1才以上5才未満	2ml	
3ヶ月以上1才未満	1ml	
3ヶ月未満の乳児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)生後3ヶ月以上であつても、1才未満の乳児には止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

成分とはたらき

黄色のシロップ剤で、60ml(大人1日服用量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分量(60ml中)	はたらき
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せきをしずめます。
dL-塩酸メチルエフェドリン	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。
キキョウ流エキス (キキョウとして)	2ml (2,000mg)	たんの切れをよくして、出しやすくします。
無水カフェイン	150mg	ねむけをおさえます。

添加物として、白糖、クエン酸、プロピレングリコール、パラベン、黄色4号(タートラジン)、香料を含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。また、一度開封した後は、品質保持のためなるべく早く服用してください。
- (5)甘味成分のためにキャップが開けにくくなるがありますが、このようなときは、温めたおしぼりなどで一度キャップ部を温めると開けやすくなります。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様相談室 電話0256(93)3171(代表) 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



吉田薬品工業株式会社

新潟県燕市吉田東栄町8番11号