

# クミアイはりぐすり

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合

効能・効果  
肩のこり、神経痛、頭痛、シワマチス、挫傷(くじき)、打撲傷(うちみ)、歯痛、関節痛、腰の痛み、筋肉痛。

## 主成分 (900cm<sup>2</sup>中)

日局 dl-カンフル	130mg
日局 l-メントール	560mg
日局 サリチル酸メチル	380mg
日局 チモール	100mg
日局 ジアエンヒドラミン	30mg

添加物としてBHT、香料を含有する。

### 用法・用量

セロファン(又はポリエチレンフィルム)をはがし、1日1～2回患部に貼付する。

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に元の袋及び箱に密閉して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。

大判 70mm×55mm×18枚



外装フィルム

箱

製造元 株式会社吉田養真堂

奈良県橿原市南八木町3丁目8番