

肩のこり・腰の痛み・筋肉痛に **コリパスL®** 品目番号 奈17-42

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合
効能・効果

肩のこり、神経痛、頭痛、リウマチス、挫傷(くじき)、打撲傷(うちみ)、歯痛、関節痛、腰の痛み、筋肉痛。

用法・用量

フィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付する。

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

成分・分量(900cm²中)

日局 dl-カンフル 130mg

日局 l-メントール 560mg

日局 サリチル酸メチル 380mg

日局 チモール 100mg

日局 ジフェンヒドラミン 30mg

添加物として生ゴム、水添口ジグリセリンエステル、脂肪族炭化水素樹脂、ポリブテン、酸化亜鉛、BHT、赤色502号、香料を含む。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に元の袋及び箱に密閉して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。

大判 70mm×55mm×22枚 ¥400

製造販売 株式会社 吉田養真堂 横原市南八木町3丁目8番22号



外装フィルム



箱