

トリツピス

(外用鎮痛消炎薬)

品目番号
奈良 17-50

【使用上の注意】

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状	状態
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ	

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 0120-875-710まで

受付時間：午前9時から12時、午後1時から5時(土、日、祝日を除く)

www.kusuribako.jp

発売元 **常盤薬品工業株式会社**

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR ノエビアグループ

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

フィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付する。

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【成分及び分量】 900cm²中

dl-カンフル 130mg
 l-メントール 560mg
 サリチル酸メチル 380mg
 ジフェンヒドラミン 30mg
 添加物として生ゴム、水添ロジングリセリンエステル、脂肪族炭化水素樹脂、ポリブテン、酸化亜鉛、チモール、BHT、赤色502号、香料を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に元の袋及び箱に密閉して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。

大判7.0cm×5.5cm

22枚入 400円(税別)



外装フィルム
: PP

123010
CCD502

製造販売元 **株式会社 吉田養真堂**

奈良県橿原市南八木町3丁目8番22号