

肩こり腰痛関節痛

品目番号 奈17-55

消炎・鎮痛外用貼付薬

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を

持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりないう場合

効能・効果

肩こり・腰痛・関節痛・筋肉痛・筋肉疲労・打撲・ねんざ・骨折痛・しもやけ

成分・分量 1m²中

ℓ-メントール……11.0g /ニル酸ワニリアマミド…0.01g
サリチル酸グリコール…7.0g 添加物としてスチレン・イソブレン・スチレンブロッコポリマー、酸化亜鉛、ポリイソブレン、ポリブテン、BHT、その他1成分を含有する。

用法・用量

薬面上のフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付する。

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に元の袋及び箱に密閉して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 表示の期限を過ぎたものは使用しないこと。

20枚入 (1枚10cm×6cm) ¥700

発売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1

製造販売元 株式会社 吉田 養 真 堂

奈良県橿原市南八木町3丁目8-22

くすり相談窓口: (0744) 22-2374

9:00～16:30(土、日、祝日を除く)

