

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

総合かぜ薬 のどの痛み・発熱・せき

カゼリッパ錠

ビタミンC・甘草末・地竜エキス散 配合

- カゼリッパ錠はのどの痛み、発熱、せき等、かぜの諸症状を緩和する成分7種類と、発熱等により失われるビタミンCを配合した総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

▼裏面もお読みください

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、せき、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の1回量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	15才以上	7～14才	5～6才	5才未満
1回量	4錠	2錠	1錠	服用しない
服用回数	1日3回			ください

<用法・用量に関連する注意>

- （1）定められた用法・用量を厳守してください。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （3）本剤は、まれに白色～淡褐色の析出物があらわれることがありますが、害はなく、効能にも支障ありませんので安心して服用してください。

成分・分量 12錠中

は た ら き	成 分	分 量
発熱等により失われたビタミンCを補給します	アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg
生薬成分の働きでかぜの諸症状を緩和します	カンゾウ末	1,500mg
熱をしずめます	地竜エキス散	200mg (原生薬換算量400mg)
発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます	アセトアミノフェン	780mg
くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状をおさえます	マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg
せき中枢に働き、せきををしずめます	リン酸ジヒドロコデイン	24mg
気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきををしずめます	d,l-塩酸メチルエフェドリン	60mg
頭痛をやわらげます	無水カフェイン	75mg

添加物：バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、タルク、エチルセルロース、カルメロース、ステアリン酸Mg

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。なお、本剤は吸湿しやすい製剤ですから、服用のつどキャップをしっかりとめてください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- （4）湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- （5）ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- （6）箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- （7）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。
なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- （8）ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

TEL 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2