

第②類医薬品

のどの痛み・発熱・せき

販売名：カゼリックC錠

総合かぜ薬

カゼリックC錠

ビタミンC・甘草末・地竜エキス散 配合

●カゼリックC錠はのどの痛み、発熱、せき等、かぜの諸症状を緩和する成分7種類と、発熱等により失われるビタミンCを配合した総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]
1. 次的人是服用しないでください  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬）
  3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります)
  4. 授乳中的人是本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
  5. 服用時は飲酒しないでください
  6. 長期連用しないでください

👉 相談すること

1. 次的人是服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。  
高熱、むくみ、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| そ の 他 | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                    | 症 状                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                       | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。                                                    |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。                                                              |
| 肝機能障害                                                    | 全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。                                                                                 |
| 間質性肺炎                                                    | 空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。） |
| 偽アルドステロン症                                                | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。                                                            |
| ぜんそく                                                     |                                                                                                                |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

▼裏面もお読みください

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかわき

## 効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、せき、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の1回量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢  | 15才以上 | 7～14才 | 5～6才 | 5才未満  |
|------|-------|-------|------|-------|
| 1回量  | 4錠    | 2錠    | 1錠   | 服用しない |
| 服用回数 | 1日3回  |       |      | ください  |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は、まれに白色～淡褐色の析出物があらわれることがありますが、害はなく、効能にも支障ありませんので安心して服用してください。

## 成分・分量 12錠中

| は た ら き                 | 成 分            | 分 量                    |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| 発熱等により失われたビタミンCを補給します   | アスコルビン酸（ビタミンC） | 500mg                  |
| 生薬成分の働きでかぜの諸症状を緩和します    | カンゾウ末          | 1,500mg                |
| 熱をしずめます                 | 地竜エキス散         | 200mg<br>(原生薬換算量400mg) |
| 発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます | アセトアミノフェン      | 780mg                  |
| くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状をおさえます   | マレイン酸クロルフェニラミン | 7.5mg                  |
| せき中枢に働き、せきをしずめます        | リン酸ジヒドロコデイン    | 24mg                   |
| 気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます | dl-塩酸メチルエフェドリン | 60mg                   |
| 頭痛をやわらげます               | 無水カフェイン        | 75mg                   |

添加物: バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、タルク、エチルセルロース、カルメロース、ステアリン酸Mg

### <成分・分量に関連する注意>

生薬成分を配合しているため、製品により色が多少異なることがありますが、薬効には影響ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。なお、本剤は吸湿しやすい製剤ですから、服用のつどキャップをしっかりとめてください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。  
ただし、本剤は衝撃により錠剤がカケることがありますので、開封後の取扱いには注意してください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にピンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。  
なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ピンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



米田薬品株式会社  
大阪市浪速区塩草3丁目2-2