

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

つらい下痢に

下痢止め薬

ガロヘパン下痢止めLP

ロペラミド塩酸塩・殺菌剤・消化酵素 配合

特 徴

ガロヘパン下痢止めLPは腸に直接作用してぜん動運動を抑えるロペラミド塩酸塩と殺菌作用のあるベルベリン塩化物水和物が食あたりや水あたり、様々な原因で起こる下痢にすぐれた効果を発揮します。




使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮座薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
(4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)
(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(6) 授乳中の人。
(7) 高齢者。
(8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気
4. 2～3日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

下痢、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便

用法・用量

次の1回量を水又はぬるま湯で、かまずに服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

下痢が止まれば服用しないでください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 2錠中

は た ら き	成 分	分 量
直接腸に作用して活発になりすぎた腸のぜん動運動を鎮めます。また腸内の水分量のバランスを整えます	ロペラミド塩酸塩	0.5mg
有害な細菌に対し、すぐれた殺菌作用をあらわし、腸内の異常な発酵や腐敗を防ぎます	ベルベリン塩化物水和物	75mg
未消化物の消化を助けます	ビオチアスターゼ2000	45mg
下痢によって消耗しやすいビタミンを補給します	チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	7.5mg
	リボフラビン(ビタミンB ₂)	3mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、マクロゴール、カルメロースCa、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 開封後は湿気をおびやすいため、アルミ袋の切り口を折り返して保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

なお、使用期限内であってもアルミ袋開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

NOVARK BIO 株式会社 お客様相談窓口

電話 0120-067-416 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



NOVARK BIO 株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2