

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

CHILDREN'S  
**BUFFERIN**CII

解熱鎮痛薬 お子さまの急な発熱に。

**小児用 バファリン CII**

〈アセトアミノフェン製剤〉

バファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の有効成分はアセトアミノフェンです。アセチルサリチル酸（アスピリン）ではありません。医師、歯科医師、薬剤師に相談する場合は、アセトアミノフェンとお伝えください。

**「小児用バファリンCII」は、  
3才から15才未満のお子さまの、熱や痛みを緩和する、  
胃にやさしい解熱鎮痛薬です。**

- 主成分アセトアミノフェンがお子さまの急な発熱・痛みを素早く緩和します。
- お子さまのためにのみやすさを考えたフルーツ味の小粒です。

#### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

##### 1. 次の人は服用しないでください

- （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

##### 3. 服用時は飲酒しないでください

##### 4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）高齢者。
- （4）本人又は家族がアレルギー体質の人。
- （5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （6）次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

## 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮ふ    | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                        | 症 状                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック(アナフィラキシー)                               | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。           |
| 肝機能障害                                        | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。                              |
| ぜんそく                                         |                                                             |

### (2) 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

#### 効能

- (1) 悪寒・発熱時の解熱
- (2) 歯痛・抜歯後の疼痛・頭痛・打撲痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

#### 用法・用量

なるべく空腹時をさけて服用してください。また、服用間隔は4時間以上おいてください。

| 年 齢    | 11歳以上<br>15歳未満 | 7歳以上<br>11歳未満 | 3歳以上<br>7歳未満 | 3歳未満    |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------|
| 1回量    | 6錠             | 4錠            | 3錠           | 服用しないこと |
| 1日服用回数 | 3回を限度とする       |               |              |         |

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

#### 成分(1錠中)

| 有効成分      | 含 量  | はたらき          |
|-----------|------|---------------|
| アセトアミノフェン | 33mg | 熱を下げ痛みをおさえます。 |

※添加物としてD-マンニトール、セルロース、CMC、サッカリンNa、サッカリン、黄色5号、ゼラチン、ステアリン酸Mg、香料を含有する。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### ■お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室 ☎03-3621-6100 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

■ホームページアドレス [www.bufferin.net/](http://www.bufferin.net/) 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。

ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7