

BUFFERIN

鎮咳去痰薬

お子さまのせき・たんの緩和に。

キッズ バファリン せきどめシロップS

バファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の有効成分はアセチルサリチル酸（アスピリン）ではありません。
医師、薬剤師に相談する場合は、非アスピリン製剤とお伝えください。

「キッズバファリンせきどめシロップS」は、3ヵ月から8才未満までのお子さま用のシロップタイプのせき止め薬です。
鎮咳剤（せきをしずめる）、去痰剤（たんのきをよくする）の有効成分と自然の生薬がせきやたんを緩和します。

- お子さまの大切な眠りをさまたげない、ノンカフェイン処方です。
- 臭化水素酸デキストロメトルファンが、せきの中枢を鎮静します。
- dl-塩酸メチルエフェドリンが交感神経に作用し、気管支を広げ、呼吸を楽にしてせきをしずめます。
- アレルギー性のせきにも効果があります。
- 自然の生薬（キキョウ、セネガ）がやさしく作用し、気管支の運動を促進してたんをきります。
- 小さなお子さまでものみやすい、いちご味のシロップです。
- お子さまの誤飲を防ぐ、安全キャップを採用しています。
- コデイン（麻薬成分）を含んでいません。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（6）次の症状のある人。
高熱、排尿困難
（7）次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

（2）5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

（必ず裏面もお読みください）

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

効 能

せき、たん

用法・用量

次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。

場合により4時間の間隔を置いて、1日6回まで服用して差し支えありません。

年 齢	5歳以上 8歳未満	3歳以上 5歳未満	1歳以上 3歳未満	3ヵ月以上 1歳未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	7.5mL	6mL	3mL	服用しないこと


<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

●注ぎ方

計量カップのフチにボトルの口をあてて注いでください。ボトルを離して注ぐと、ボトルの口もとにシロップがたれ、それが固まるとキャップが開かなくなることがあります。

●1回の服用量



成 分 (60mL中)

有 効 成 分	含 量	はたらき
臭化水素酸デキストロメトルファン	20mg	せきをしずめます
dl-塩酸メチルエフェドリン	25mg	呼吸を楽にし、せきをおさえます
グアイフェネシン	100mg	
キョウ流エキス(原生薬換算量660mg)	0.66mL	たんを出しやすくします
セネガ流エキス(原生薬換算量660mg)	0.66mL	
塩酸ジフェンヒドラミン	30mg	アレルギーによるせきをしずめます

添加物として白糖、カラメル、グリセリン、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、エチルバニリン、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 計量カップは、使用后水洗いなどして、清潔に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 本品には生薬エキスが配合されているため、まれに微混濁が生じる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (7) キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50～60℃)に2～3分つけると開けやすくなります。

安全キャップの使用法

■計量カップ
計量カップを
はずしてから、
お使いください。



■安全キャップのあけ方

①キャップを強く押し
ながら②矢印の方向
に回してあけます。

※テーブルの上に
置いて上から押すと、
力を入れやすくなります。

■安全キャップのしめ方

ボトルの口の周囲を
よく拭いてから、
普通のキャップを
しめる要領で
しっかりしめて
ください。



■お問い合わせ先 ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100 受付時間: 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

■ホームページアドレス www.bufferin.net/ 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。