

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

非ステロイド

かゆい「部位」に効く デリケートエリアなどのかゆみ・かぶれに ＜鎮痒消炎薬＞ **メソッド UFクリーム** 第2類医薬品

＜こんな症状に・こんな方に＞

我慢できない
かゆみに

生理用品などで
かぶれる

蒸れて
ムズムズかゆい

5種の有効成分が効く



かゆみを
すばやく止める

・ジフェンヒドラミン

炎症を鎮め、
赤みやブツブツを抑える

・ウフェナマート
・グリチルレチン酸

患部を殺菌する

・ベンゼトニウム塩化物

血行を促進し、
患部の修復を助ける

・トコフェロール酢酸エステル

●ベタつかず、肌にやさしくなじむクリーム ●無着色、無香料

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

効 能

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、あせも、ただれ、おむつかぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 患部を清潔にした後、塗布してください。

成分(1g中)

有効成分	含 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみをすばやく止めます。
ウフェナマート	50mg	炎症を鎮め、赤みやブツブツを抑えます。
グリチルレチン酸	3mg	
ベンゼトニウム塩化物	1mg	患部を殺菌します。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を助けます。

添加物：ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、流動パラフィン、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 金属及びプラスチック類(メガネ、時計、アクセサリー等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)、衣類などに付着すると変質又は変色する場合があるので注意してください。
- (6) 使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。

“家でも、外出先でも”デリケートエリアなどのかゆみに、2つのタイプがあります。

●**家で使うのにおススメ。**塗って治療する〈クリームタイプ〉：メソッド UFクリーム **第2類医薬品**

●**外出先で使いやすい。**サッと拭いて有効成分を塗れる〈シートタイプ〉：メソッド シート **第3類医薬品**

■お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7