

ロキソニンSテープmini 20枚入  
(2枚×10組×1袋)使用前にこの箱の説明文書を必ず  
お読み下さい。また、必要時に  
読めるよう大切に保管して下さい。製品情報 ▼  
Product Info特  
徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を配合。

肌から吸収されると活性型に変化、  
つらい痛みのお芯まで直接浸透して  
しっかり効く。1日1回使用。貼り心地がよく、  
すぐれた伸縮性ではがれにくく、  
貼りなおしやすい。

## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用<sup>してぜんそくを起こしたことがある人</sup>
  - (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) じしん、かぶれ、傷口
  - (3) あずむし、たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
4. 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けて下さい)



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の診療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 高齢者
  - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありまので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位  | 症 状                                    |
|-------|----------------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着 |
| 消 化 器 | 胃部不快感、みぞおちの痛み                          |
| そ の 他 | むくみ                                    |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 使用後、次の症状があらわれた場合がありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患の可能性がありま)

## 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。  
(用法・用量に関連する注意) (1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3)1日あたり8枚を超えて使用しないで下さい。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

## 成分・分量(膏体100g中)

| 成 分                  | 分 量                 | はたらき                       |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| ロキソプロフェン<br>ナトリウム水和物 | 5.67g<br>(無水物として5g) | 炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】をおさえます。 |

添加物：スチレン・イソブレン・スチレンブロッコポリマー、ポリインブテン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、トメントール、流動パラフィン、その他2成分  
【1枚あたり(5cm×7cm) 膏体量0.5g】

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手が届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元 01 登録商標

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



4 987107 676955