

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

鼻炎用内服薬

鼻みず・くしゃみ・鼻づまりに中身が液状の小さなカプセル

ロート鼻炎ソフトカプセル ヌア[®]α

●塩酸プソイドエフェドリン+dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩配合

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性の鼻炎症状は大変つらいものです。不快症状が続くと、気分がすぐれず睡眠不足など日常生活にまで影響を及ぼしかねません。こんなときは、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎症状にすぐれた効き目のある「**ロート鼻炎ソフトカプセル ヌア[®]α**」が効果的です。

使用上の注意 ⚠

●してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人……………前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人……………高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないでください。

●相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起したことがある人*
- (7) 次の症状のある人……………高熱、排尿困難、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人……………緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、 <u>けいれん*</u>
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は販売登録者にご相談ください。

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量(1日量：3カプセル中)

有効成分	配合量
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg
塩酸ブソイドエフェドリン	75mg
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
グリチルリチン酸二カリウム	60mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg
無水カフェイン	90mg

添加物：ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン

保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401191903