はやくよくなりますように。

この外箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

■**使用上の注意** ●**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）1. 次の部位には使用しないこと。(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷のあるところ

●**相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■**保管及び取り扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先　0120-149-931

開封口



Anti-Itch Cream

■販売名：メンソレータム®ADクリームm　第2類医薬品

効能・効果	かゆみ、皮フ炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、しっしん、ただれ、あせも、しもやけ
用法・用量	1日数回、適量を患部にぬってください。

＜用法・用量に関連する注意＞(1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 外用にのみ使用すること。

こんなかゆみに…



就寝中のムズムズがまんできないかゆみ　下着のしめつけ、こすれで起こる皮フ炎　かけばかくほどイライラするかゆみ

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク
東京：03-5442-6020
大阪：06-6758-1230
受付時間9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

しつこい
かゆみに効く！

第2類医薬品
鎮痒消炎薬

防腐剤無添加※

［クリームタイプ］

商品の詳細はこちらから▶

ココロト♥Park：
あなたの貴重なご意見をお届けください。
https://coco.rohto.com/mentholatum/

カサつく肌のかゆみ治療薬

メンソレータム® AD


かゆみに効く！

3つのかゆみ止め成分

しっとりとした使い心地　第2類医薬品　税控除対象

3つのかゆみ止め成分配合で、
乾燥等によるかゆみを素早く抑えます。

クロタミトン	リドカイン	ジフェンヒドラミン
温感神経に働き、かゆみを軽減します。	かゆみ神経の働きを弱めます。	かゆみの原因であるヒスタミンの作用を止めます。



かゆみをしっかり抑えて
かゆみのおきにくい肌へ！
抗炎症成分、ビタミンE誘導体配合

保湿基剤（グリセリン）配合で、カサつく肌もなめらかに。

■**成分（1g中）** クロタミトン…50mg、リドカイン…20mg、ジフェンヒドラミン…10mg、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE誘導体）…5mg、グリチルレチン酸…2mg ●添加物として、流動パラフィン、グリセリン、1,3-プチレングリコール、尿素、ステアリン酸グリセリン、2,2',2"-ニトリロトリエタノール（トリエタノールアミン）、パルミチン酸イソプロピル、セトマクロゴール、乳酸Na、カルボキシビニルポリマー、セタノール、コレステロール、DL-メントール、塩化Mgを含有する。

ステロイド成分を配合していません。※防腐剤（パラベン等）を配合しておりません。