

*: 2016年4月 通知により改訂
2016年1月 記載要領変更に伴う改訂

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

アレルギー性鼻炎などによるつらい鼻水・苦しい鼻づまりに

鼻炎用内服薬

眠くなりにくい

メキタジン配合

ロートアルガード® 鼻炎内服薬ZII

ソフトカプセル

第2類医薬品

『ロートアルガード鼻炎内服薬ZII』は、花粉・ハウスダストなどによる鼻みず・鼻づまり・くしゃみといったアレルギー性鼻炎症状にすぐれた効果を発揮します。抗アレルギー作用と抗ヒスタミン作用を兼ね備え、かつ眠くなりにくい成分「メキタジン」と、つらい鼻水・苦しい鼻づまりに直接作用するWの成分を組み合わせた効き目を求める方におすすめの鼻炎内服薬です。

アルガード鼻炎内服薬ZIIの6つの有効成分

メキタジン

つらい鼻みず・くしゃみをしっかりと緩和するとともに、アレルギーの発生原因を抑えます。

【抗アレルギー作用】 【抗ヒスタミン作用】

Wの成分が効く!

塩酸プロソイド
エフェドリン
×
dl-メチルエフェドリン
塩酸塩

交感神経に働いて、
つらい鼻づまりを抑えます。
【血管収縮作用】

ベラドンナ 総アルカロイド

副交感神経に働いて、
鼻みずの分泌を抑えます。
【鼻汁分泌抑制作用】

無水カフェイン

頭重をやわらげます。
【頭重抑制作用】

グリチルリチン酸二カリウム

炎症を抑え、のどの痛みをやわらげます。

【抗炎症作用】

⚠ 使用上の注意

（X）してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある）

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。（4）高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
(セレギリン塩酸塩は、パーキンソン病の治療に用いられる)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性 膿疱症*	高熱、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮ふ上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。*
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

次の量を食後に、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	



(用法・用量に関する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)カプセルの取り出し方／上図のようにカプセルのはいっているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

成分・分量 (1日量 3カプセル中)

有効成分	分 量
メキタジン	4mg
塩酸プロソイドエフェドリン	75mg
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg
グリチルリチン酸二カリウム	60mg
無水カフェイン	90mg

添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタンを含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

13423616D