

狙ったところにヒタッ  
スプレータイプ



かさつく肌のかゆみ治療薬

メンソレータム<sup>®</sup>  
AD

かゆみに  
効く!

3つの  
かゆみ止め  
成分

第2類医薬品

税 控除 対象 100mL

ROHTO

## 鎮痒消炎薬 [販売名]メンソレータム<sup>®</sup>ADスプレー

### ⚠ 使用上の注意

■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。  
(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等(2) 傷のあるところ。

■相対すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿疹やただれのひびい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮フ・発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺痛感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 かゆみ、皮フ炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、しっしん、ただれ、あせも、しちやけ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 外用にのみ使用すること。(4) 使用前によく振ること。(5) 患部まで約20cmの距離で噴霧すること。(6) 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないこと。(7) 本剤を直接吸入しないこと。(8) 顔に向けて噴霧しないこと。

【成分・分量】 原液 1g中  
クロタミソール50mg、リドカイン20mg、ジフェンヒドラミン10mg、グリチルレチン酸2mg ※添加物としてエタノール、尿素、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒドロキシプロピルセルロース、β-メントール、香料、DMEを含有する。

ステロイド成分を配合していません。

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手が届かないところに保管すること。(3) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5) 横向きに使用しないこと。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてないこと。⑤使い切って捨てること。  
高圧ガス：DME

- 暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
- 捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること。
- フロンガスは使用していません。

本品は缶の外側を透明フィルムで包んでいます。



外装フィルムキャップ

第2類医薬品

内容量：100mL  
火気厳禁 第二石油類 51mL  
使用期限：缶底に記載

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

お客様安心サポートデスク TEL.06-6758-1230  
受付時間 9:00～18:00(土、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区箕西1-8-1



4