

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう保管してください。



かゆみを伴う乾燥肌の治療薬

第2類医薬品

メンソレータム®
AD 乳液b

乾燥性皮膚用薬

しつこいかゆみを伴う乾燥肌に！

気温や湿度の低い冬に多く発生する乾燥性皮膚は、肌の油分や水分の減少などが原因で起こり、
しばしば広い範囲に強くしつこいかゆみを伴います。

「メンソレータムAD乳液b」は、乾燥した肌に起こるかゆみをすばやくしずめながら、
次第にかゆみの起きにくいしっとりした肌へと治していく薬です。

メンソレータムAD乳液bの働き

1

3つのかゆみ止め成分（クロタミトン、リドカイン、ジフェンヒドラミン）の働きで、乾燥によって起こるしつこいかゆみをしずめます。

クロタミトン


温感神経に働き、かゆみを軽減します。

リドカイン

かゆみ神経の働きを弱めます。

ジフェンヒドラミン


かゆみの原因であるヒスタミンの作用を止めます。



かゆみをしっかり抑える！

2

肌に欠かせない天然保湿因子である尿素を10%配合し、かゆみを伴う乾燥肌を、次第にかゆみの起きにくいしっとり肌へと治していきます。



● こんなかゆい乾燥肌に…

- ・お風呂上がりや就寝前など、かゆみを伴う皮膚の乾燥を感じたとき
 - ・ガラガラした乾燥性皮膚の症状が現れたとき
- 乾燥しやすいスネ、背中、腕などに一日数回塗り伸ばしてください。

べたつかず、
広範囲にすーっと
伸ばしやすい
乳液タイプ



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- (2) 傷口、または赤くはれているところ
- (3) ただれやひび割れのひどいところ

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ヒリヒリ感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態、かぶれ、乾燥感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分 (1g中)

尿素……………100mg ジフェンヒドラミン……………10mg
クロタミトン……………50mg トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) ……5mg
リドカイン……………20mg グリチルリチン酸-アノモニウム……………5mg

●添加物として、グリセリン、ステアリン酸グリセリン、乳酸Na、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、セタノール、コレステロール、キサンタンガム、カラギーナン、ℓ-メントール、塩化Mg、ポリオキシエチレンセチルエーテル、pH調整剤を含有する。

ステロイド成分を配合していません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区異西1-8-1

401556901