

アトピックドライスキンなどの方の湿疹・皮フ炎・かゆみ治療薬



メンソレータム®

APソフト

医薬品ローション

つらい湿疹・皮フ炎・かゆみによく効きます

体質的に湿疹ができやすい方、乾燥によって皮フのバリアがこわれ、外部刺激によって炎症や湿疹が起きやすい方など、湿疹・皮フ炎に悩まれている方へ・・・

メンソレータムAPソフトローションは、アトピックドライスキンなどの方の湿疹・皮フ炎のために、治療効果・安全性に加え、保湿力・使用感にもこだわった治療薬です。



炎症をしっかり鎮める

高い消炎効果を持つ吉草酸酢酸プレドニゾロンが湿疹やかゆみに効きます

アンテドラッグステロイド採用

患部でよく効き、体内に吸収されると低活性になる性質のステロイドです

保湿力の高いクリームローション

微細化ワセリンにより、クリームのような保湿力を持ちながら、べたつかないローションの使い心地を実現

●●● 低刺激性タイプ ●●●

このようなときにおすすめです

- 乾燥性の皮フ炎
- ひじ・ひざの内側などの湿疹
- 腕・脚・背中などの湿疹
- がまんできないかゆみ



治療の
コツ

1 少量ずつこまめにぬる

少量ずつこまめにぬりましょう。
1度に大量にまとめぬりしても効果があがるものではありません。

3 しっかり保湿する

症状がよくなってきた部位には保湿剤を使うなど、薬と保湿剤を上手に使い分けましょう。また、治った後も湿疹症状の再発を防ぐためにはしっかり保湿ケアをすることが大切です。

2 徐々に使用回数を減らす

症状が治まってきたら使用回数を徐々に減らしていきましょう。

- 症状のない部位にはご使用にならないでください。
- こまめにぬっても症状がよくならない、湿疹等の症状が治ってもはれや痛みがある、慢性的に症状を繰り返す等の場合は医師へのご相談をおすすめします。

〈メンソレータム®APソフトシリーズ〉 保湿用
メンソレータム®APソフトシリーズには薬用保湿ローションもございます

湿疹や皮フ炎が治った後の保湿ケアにおすすめです。
[皮フの乾燥・肌あれを防ぐ]

医薬部外品



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

メンソレータム®APソフトローション 湿疹・皮フ炎・かゆみ治療薬

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、水虫・たむし等または化膿している患部
(2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 患部が広範囲の人
(6) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師にご相談ください。
(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
皮フ(患部)	水虫・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■効能・効果 湿疹、皮フ炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん

■用法・用量 1日数回、適量を患部にぬってください。

●必ず振ってからご使用ください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみご使用ください。
- (5) ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

■成分・分量(1g中)

吉草酸酢酸プレドニゾロン(アンテドラッグステロイド)……………1.5mg

添加物として、グリセリン、ワセリン、水素添加大豆リン脂質、キサンタンガム、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミドを配合する。

■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕西1-8-1

400735602