

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

胃腸薬

パンシロン® 新胃腸薬_a

食べすぎ・飲みすぎ・胃もたれ・胸やけに

製品特長

パンシロン 新胃腸薬_aは、食事やアルコールなどに起因する胃腸の不快な症状を取りさり、さらに、荒れた胃粘膜を修復保護し胃の働きを活発に戻す胃腸薬です。また、3種の消化酵素で消化力を高めるので、最近の脂肪の多い食事の後にもすぐれた効き目があります。



13種の有効成分をバランスよく配合

1. 速効性の制酸剤と胃酸分泌抑制作用をもつ制酸剤を配合し、胃内の酸度を一定に整え、胃の痛みや胸やけを効果的に鎮めます。
2. 3種の消化酵素で消化力が上がり、脂肪の多い食事の後にも胃腸の負担を軽くします。
3. 痛みの原因となっている胃の荒れや炎症に対し、アルジオキサが胃粘膜を修復し保護します。
4. 芳香性健胃生薬が、飲みすぎ等で弱った胃の働きを活発にします。
5. 爽やかな味の溶けやすい微粒タイプで、胃がスーッとします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は、服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進

用法・用量

次の量を食後または食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1 包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8 才以上11才未満	1/2包	
5 才以上 8 才未満	1/3包	
5 才未満	服用しないこと	

※食間とは…食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用:1包(1.547g)中

有 効 成 分		配 合 量	作 用
消 化 剤	リパーゼAP12	7mg	脂肪、でんぷん、タンパクに対応する3つの消化酵素が、胃内の食物を効果的に消化し、栄養素の分解・吸収を助けます。
	プロザイム6	5mg	
	ピオチアスターゼ2000	30mg	
制 酸 剤	ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	330mg	胃酸を直接中和する速効性の制酸剤と胃酸分泌抑制作用をもつ制酸剤を配合。胃の痛みや胸やけを効果的に鎮めます。
	炭酸水素ナトリウム	770mg	
	ロートエキス	10mg	
胃粘膜修復剤	アルジオキサ	50mg	荒れた胃粘膜を修復・保護します。
	カンゾウ末	50mg	
健 胃 剤	ウコン末	40mg	爽やかな香りの生薬が、胃の機能を高め、運動を活発にします。
	ケイヒ末	90mg	
	コウボク末	50mg	
	チョウジ末	10mg	
	ニンジン末	10mg	

●添加物:セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、アルギン酸Na、l-メントール、ハッカ油

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5)1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ロート ロート製薬株式会社
大阪市生野区糺西1-8-1

400654201