

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンAZ

第2類医薬品

胃の痛み、胃部不快感
胃粘膜修復剤配合胃腸薬

パンシロン®


AZ

胃腸薬

製品の特徴


ストレスなどによって胃粘膜の抵抗力が弱まると胃壁は胃液によって傷ついてしまいます。パンシロンAZは、効果的な食前・食間の空腹時服用型で、傷ついた胃粘膜を修復・保護して、胃の不快感を改善します。

1) 荒れた胃粘膜を修復します。



2種の胃粘膜修復剤が協力的にはたらくことで、傷ついた粘膜組織の再生を促進し、胃の粘膜を修復します。

2) すぐれた消炎作用とともに、胃壁に保護膜を形成します。



胃の荒れや炎症部分に成分が直接作用して症状をしずめ、さらに胃壁の表面に膜を作って、胃酸やペプシンの攻撃から胃を守ります。

3) 胃の痛み、むかつきなど不快な症状をとり除きます。

速効性と持続性の制酸剤の組合せによって過剰な酸を中和するとともに、胃酸分泌を抑制して、胃の痛み、むかつきなどの不快な症状をとり除きます。

使用上の注意



■してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある)
4. 長期連用しないでください。

■相談すること ■

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃痛、胃部不快感、胸やけ、胃重、胃もたれ、胃酸過多、胃部膨満感、胸つかえ、はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐、げっぷ（おくび）、飲みすぎ

用法・用量

次の量を食前又は食間の空腹時に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15 才以上	1 包	3 回
11 才以上 15 才未満	2 / 3 包	
11 才未満	服用しないこと	

*食間とは…
食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用 (3包中)

	有 効 成 分	配 合 量	作 用
制 酸 剤	炭酸水素ナトリウム	1800mg	胃酸を速効的に中和します。
	重質炭酸マグネシウム	180mg	
	沈降炭酸カルシウム	540mg	
	メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	600mg	胃酸を持続的に中和し、胃粘膜表面に附着して膜を作り、胃粘膜を保護するとともに、抗ペプシン作用も示します。
	ロートエキス	30mg	胃液分泌抑制作用があり、制酸剤と組み合わせると胃酸中和効果が持続します。
粘 膜 修 復 剤	アズレンスルホン酸 ナトリウム	6mg	消炎作用を有するカムツシという植物の研究から得られた成分で、胃粘膜に直接作用して炎症をしずめます。また粘膜組織を再生して胃粘膜を修復します。
	L-グルタミン	900mg	アミノ酸の一種で、胃粘膜の表面を覆う粘液の生合成を促して、胃粘膜の修復を助けます。さらに胃酸の胃粘膜内への逆侵入を防ぐという、逆拡散抑制作用もあります。

添加物：カンゾウ、ℓ-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、D-マンニトール

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
(5) 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401090503