

第3類医薬品



ビタミンC主薬製剤

 ビタミンC・E・B₂配合 **ビメロンホワイトC**

ビメロンホワイトCはビタミンC（アスコルビン酸）にその働きを助けるビタミンB₂（リボフラビン）と天然型ビタミンE（コハク酸d- α -トコフェロール）を配合したビタミンC主薬製剤です。しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和、肉体疲労時などのビタミンC補給にお役立下さい。又、植物由来「プルラン」を原料としたカプセルを使用しています。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（効能・効果）

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

（用法・用量（1回分））

大人（15歳以上）	／／ 2カプセル
11歳以上 15歳未満	／ 1カプセル
7歳以上 11歳未満	／ 1カプセル
7歳未満	服用しないこと

● 1日2回朝夕服用する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

（成分・分量）

4カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
アスコルビン酸(V. C)	1,200.0mg
コハク酸d- α -トコフェロール(V. E)	100.0mg
リボフラビン(V. B ₂)	10.0mg


添加物として部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料（酸化チタン）、プルランを含む。

（保管及び取扱い上の注意）

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

■お問い合わせ先

ワキ製薬株式会社 お客様相談室
住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
電話 0120-200-114
受付時間 9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

ワキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL : <http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）