

2015年12月

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

ビタミンC主薬製剤

ビタミンC・E・B2 配合

ビメロンホワイトC

第3類医薬品

ビメロンホワイトC はビタミンC (アスコルビン酸) にその働きを助けるビタミンB₂ (リボフラビン) と天然型ビタミンE (コハク酸d- α -トコフェロール) を配合したビタミンC主薬製剤です。しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和、肉体疲労時などのビタミンC補給にお役立ください。又、植物由来「プルラン」を原料としたカプセルを使用しています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
 3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

裏面もお読みください

【用法・用量】（1回分）

大人（15歳以上）	 2カプセル
11歳以上 15歳未満	 1カプセル
7歳以上 11歳未満	 1カプセル
7歳未満	服用しないこと

● 1日2回朝夕服用する。

＜用法・用量に関連する注意＞

（1）用法・用量を厳守すること。

（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

4カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
アスコルビン酸（V.C）	1,200.0mg
コハク酸d- α -トコフェロール（V.E）	100.0mg
リボフラビン（V.B ₂ ）	10.0mg

添加物として部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料（酸化チタン）、プルランを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

（2）小児の手の届かない所に保管すること。

（3）他の容器に入れ替えないこと。

（誤用の原因になったり品質が変わる。）

（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



発売元

ビー・アップル株式会社

東京都中央区東日本橋2-2-6

製造販売元

ワキ製薬株式会社

奈良県北葛城郡広陵町南郷898

ご注文専用

TEL:0570-008-280（朝8時～夜10時 年中無休）

FAX:03-3863-8839（24時間受付 年中無休）

お問合せ専用

TEL:03-3851-6868（朝9時30分～夜6時 土日祝日休み）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）