

第2類医薬品

解熱鎮痛薬

痛み、熱に 痛みの元をすばやくブロック!

ピタリル プラス



ピタリル プラスは、さわやかな香りの服用しやすい錠剤の解熱鎮痛薬です。日頃私たちを悩ませる頭痛・生理痛・神経痛などの痛みや熱に効きめをあらわします。非ピリン系の解熱鎮痛薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症	状	関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ		精神神経系	めまい	
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振		その他	過度の体温低下	

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症	状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。	

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の 発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身が だるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、 尿量の減少等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書
を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔成分・分量〕 6錠中

成 分	分 量	成 分	分 量
アセトアミノフェン	600mg	アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg
エテンザミド	600mg	無水カフェイン	100mg

添加物として結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸
マグネシウム、L-メントール、青色1号を含む。

〔効能・効果〕

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・
打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

〔用法・用量〕

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服
用します。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回まで
7歳以上15歳未満	2錠	
7歳未満は服用しない		

〈用法・用量に関連する注意〉



- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、(PTPシートの取り出し図)
保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) 錠剤の取り出し方
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し
て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き
刺さるなど思わぬ事故につながります。)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管
してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

連絡先 ワキ製薬株式会社 お客様相談室
住 所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
電 話 0120-200-114
受付時間 午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

WAKI ワキ製薬株式会社
〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
URL: <http://www.a-kusuri.co.jp/>