

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

Grace & Lucere

SIMIUS

SERIES



ホワイトC

ホワイトCはビタミンC(アスコルビン酸)にその働きを助けるビタミンB₂(リボフラビン)と天然型ビタミンE(コハク酸d- α -トコフェロール)を配合したビタミンC主薬製剤です。

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和、肉体疲労時などのビタミンC補給にお役立下さい。
又、植物由来「プルラン」を原料としたカプセルを使用しています。



相談すること



使用上の注意

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（効能・効果）

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

（用法・用量（1回分））

大人（15歳以上）	 2カプセル
11歳以上 15歳未満	 1カプセル
7歳以上 11歳未満	 1カプセル
7歳未満	服用しないこと

● 1日2回朝夕服用する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

（成分・分量）

4カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
アスコルビン酸（V. C）	1,200.0mg
コハク酸d- α -トコフェロール（V. E）	100.0mg
リボフラビン（V. B ₂ ）	10.0mg

添加物として部分アルファ化デンプン、乳糖水和物、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料（酸化チタン）、プルランを含む。

（保管及び取扱い上の注意）

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



発 売 元 株式会社メビウス製薬
東京都港区赤坂9-5-24赤坂日本ビル5F
☎0120-432-010

製造販売元 ワキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）