

もたれ・食べすぎ・消化不良に

フクナガ胃腸薬G

胆汁エキス末配合

製品の特徴

フクナガ胃腸薬Gは、胆汁エキス末をはじめ消化酵素「パンクレアチン」や生薬を配合した胃腸薬で、弱った胃腸の動きを助け、もたれ、食べすぎ、消化不良などに効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき

その他の注意

1. 母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

もたれ、食べすぎ、消化不良、飲みすぎ、胃部・腹部膨満感、胃弱、消化促進、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胸つかえ、食欲不振

用法・用量

1 回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	5 錠	3 回
11才以上15才未満	3 錠	
8才以上11才未満	2 錠	
3才以上8才未満	1 錠	
3才未満	服用させないで下さい	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

成分とはたらき

成 分	分量 (15錠中)	は た ら き
胆汁エキス末	450mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化吸収を助けます。
パンクレアチン	375mg	三大栄養素の消化を助ける酵素で、胆汁エキス末と協力し、胃腸の負担を軽減します。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌をおさえます。
ホミカエキス	30mg	健胃生薬で、弱った胃腸の働きを助けます。
ケイヒ末	60mg	

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、カラメルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) ピンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいて下さい。



ワンポイント情報

私たちは日常、食生活の不摂生などの結果として、胃腸の不快感を感じる場合があります。しかし、同じ症状、例えば、もたれやむかつきなどを感じた時でも、体の中の状態により適した胃腸薬は異なる場合があります。消化液（胃酸など）の分泌は過剰か、あるいは不足きみか、胃腸の運動機能は活発か、あるいは衰えている感じか、などは状態の違いの一例です。ご自分にあった胃腸薬がよくわからないという方は、薬局・薬店などでご相談の上、お選びになることをおすすめします。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>