

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

もたれ・消化不良・胸やけ・食欲不振に

第2類医薬品

フクナガ

胃腸薬G

ー胃腸の不快感にバランスよく効くー

製品の特徴

フクナガ胃腸薬Gは、

- 胆汁エクス末をはじめ消化酵素「パンクレアチン」や生薬を配合した胃腸薬で、弱った胃腸の働きを助け、もたれ、消化不良、胸やけ、食欲不振などに効果を発揮します。
- 小粒でのみやすい錠剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 排尿困難
 - 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

- 母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

もたれ、消化不良、胸やけ、食欲不振、食べすぎ、飲みすぎ、胃部・腹部膨満感、胃弱、消化促進、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胸つかえ

用法・用量

1 回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	5 錠	3 回
11才以上15才未満	3 錠	
8才以上11才未満	2 錠	
3才以上8才未満	1 錠	
3才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分とはたらき

成 分	分 量(15錠中)	は た ら き
胆汁エキス末	450mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化吸收を助け、もたれなどを緩和します。
パングレアチン	375mg	三大栄養素の消化を助ける酵素で、胆汁エキス末と協力し、胃腸の負担を軽減します。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑えます。
ホミカエキス	30mg	特有の味・芳香のある健胃生薬で、弱った胃腸の働きを助け、食欲不振を改善します。
ケイヒ末	60mg	

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、カラメルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ピンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

●ワンポイント情報

私たちは日常、食生活の不摂生やストレスなどの結果として、胃腸の不快感を感じる場合があります。しかし、同じ症状、例えば、もたれやむかつきなどを感じた時でも、体の状態により適した胃腸薬は異なる場合があります。

消化液(胃酸など)の分泌は過剰か、あるいは不足がみか、胃腸の運動機能は活発か、あるいは衰えている感じか、などは状態の違いの一例です。配合されている成分の働きを知って、自分の症状に適した胃腸薬を選択すれば効果的に症状の改善ができます。

ご自分にあった胃腸薬がよくわからないという方は、薬剤師など専門家にご相談の上、お選びになることをおすすめします。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/