

この説明文書はお薬とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読み下さい。

医薬品

痔疾治療薬

レックH[®]軟膏

製品の特徴

レックH軟膏は7種類の有効成分の配合により、痔にともなう痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれなどの症状にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

- (2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布して下さい。なお、1日3回まで使用できます。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (2) 肛門部にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成 分	分量 (1g中)	はたらき
リドカイン	30mg	患部の痛み・かゆみをしずめます。
酸化亜鉛	200mg	患部の炎症をおさえ、保護します。
塩酸クロルヘキシジン	2.5mg	細菌による感染を防ぎます。
アラントイン	10mg	傷口の治りを早め、痔の症状をしずめます。
グリチルレチン酸	10mg	患部の炎症をおさえます。
酢酸トコフェロール	10mg	末梢の血行をよくし、患部のはれ・痛みなどの症状をしずめます。
β-メントール	2mg	患部に清涼感を与え、かゆみをしずめます。

添加物として、無水ケイ酸、グリセリン脂肪酸エステル、ゲル化炭化水素を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

ワンポイント情報

痔を早く治すために

痔は、肛門周囲の血流が悪くなり、うっ血や炎症を起こす疾患です。お薬とともに、日常生活における養生が大切です。

1. アルコール類、タバコ、コーヒーなどの刺激物は控えましょう。
2. バランスの取れた食事を心がけ、便秘を整えましょう。
3. 散歩や体操、入浴などで血行を促しましょう。
4. 患部はいつも清潔にしましょう。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
東京都千代田区三崎町1-3-12
(03)3293-3363 (ダイヤルイン)
(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し祝祭日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36