




外用殺菌
消毒薬

新レブメント®-FN



第2類医薬品

内容量
150mL

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
 - 次の場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感 |
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒。
- 痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒。

用法・用量

1日数回ガーゼ・脱脂綿等に浸して塗布して下さい。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。

＜ご使用前の注意＞

- ★数回、から押しして下さい。 ★容器を激しく振らないで下さい。
- ★先端（噴霧口）を針などで突かないで下さい。

成分・分量（100mL中）

塩化ベンザルコニウム・・・0.05g 塩酸ナファゾリン・・・0.05g
塩酸ジフェニヒドラミン・・・0.50g 塩酸ジブカイン・・・0.25g
添加物として、クエン酸、クエン酸Na、炭酸水素Na、香料、pH調整剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、立てて保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

使用期限・製造番号は底面に表示


お問い合わせ先

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)
(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し祝日を除く) 副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元



湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>



外装フィルム
キャップ
瓶

JCM8A