



外用殺菌
消毒薬

新レブメント®-FN



第2類医薬品

内容量
150mL

新レブメント-FN

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)患部が広範囲の人
(4)深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感
- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒。
- 痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒。

用法・用量

1日数回ガーゼ・脱脂綿等に浸して塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

＜ご使用前の注意＞

- ★数回、から押ししてください。 ★容器を激しく振らないでください。
- ★先端（噴霧口）を針などで突かないでください。

成分・分量（100mL中）

ベンザルコニウム塩化物・・・0.05g ナファゾリン塩酸塩・・・0.05g
ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・0.50g ジブカイン塩酸塩・・・0.25g
添加物として、クエン酸、クエン酸Na、炭酸水素Na、香料、pH調整剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用期限・製造番号は底面に表示

お客様相談室
☎03-3293-3363


副作用救済制度
☎0120-149-931



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>



外装フィルム
キャップ
瓶

CIM8A