

この説明文書はお薬とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読み下さい。

外用湿疹・皮ふ炎用薬 医薬品
ワツナガ キョーチルベ[®]S クリーム
酢酸ヒドロコルチゾン配合

製品の特徴

ワツナガ キョーチルベ[®]S クリームは、皮ふ炎や湿疹などを治療し、改善するための外用皮膚病薬です。抗炎症作用をもつ副腎皮質ホルモンの酢酸ヒドロコルチゾンが、クロタミトンと協力して患部のかゆみをしずめます。クリームタイプで、べとつきがなく使用感のよい白色の軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ぶ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 ぶ (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

効能・効果

皮ふ炎、湿疹、かゆみ、じんましん、ただれ、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦して下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成 分	分量 (100g中)	はたらき
酢酸ヒドロコルチゾン	0.5g	抗炎症作用、抗アレルギー作用を示す副腎皮質ホルモンで、湿疹、かぶれ、かゆみなどをおさえます。
クロタミトン	10g	患部のかゆみをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	1g	患部の炎症をおさえ、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	かき傷や、ただれた患部を細菌感染から守ります。
塩酸ジブカイン	0.2g	患部のかゆみをしずめます。

添加物として、パラベン、エデト酸Na、セタノール、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、シリコン樹脂、乳酸、ポビドン、ミリスチン酸オクチルドデシルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

ワンポイント情報



皮膚病には種々の原因がありますが、その治療の基本は皮膚を清潔にし、適切なお薬を用いることです。間違ったお薬を用いると、症状を悪化させることがありますので注意が必要です。

患部にかゆみがあっても、かきむしらないで下さい。かきむしると皮膚を傷つけ、細菌感染などを引き起こし、症状の悪化や新たな皮膚病を誘発する原因となります。

また、軟膏やクリームなどの皮膚外用薬を使用するときは、まず手を石鹸などできれいに洗ってから、塗るようにして下さい。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
東京都千代田区三崎町1-3-12
(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)
(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し祝祭日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

FGP5