

この説明文書はお薬とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読み下さい。

外用湿疹・皮ふ炎用薬 第②類医薬品

フナガ キョーチルベ[®]S クリーム

酢酸ヒドロコルチゾン配合

製品の特徴

フナガ キョーチルベ[®]S クリームは、皮ふ炎や湿疹などを治療し、改善するための外用皮膚病薬です。抗炎症作用をもつ副腎皮質ホルモンの酢酸ヒドロコルチゾンが、クロタミトンと協力して患部のかゆみをしずめます。クリームタイプで、べとつきがなく使用感のよい白色の軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等
又は化膿している患部
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して
下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明
文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬 症、にきび、化膿症状、持 続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなり
ない場合

効能・効果

皮ふ炎、湿疹、かゆみ、じんましん、ただれ、あ
せも、かぶれ、しもやけ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦して下さい。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させて下さい。
- (2) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で
洗って下さい。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成分	分量 (100g中)	はたらき
酢酸ヒドロコルチゾン	0.5g	抗炎症作用、抗アレルギー作用を示す副腎皮質ホルモンで、湿疹、かぶれ、かゆみなどをおさえます。
クロタミトン	10g	患部のかゆみをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	1g	患部の炎症をおさえ、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	かき傷や、ただれた患部を細菌感染から守ります。
塩酸ジブカイン	0.2g	患部のかゆみをしずめます。

添加物として、パラベン、エデト酸Na、セタノール、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、シリコーン樹脂、乳酸、ポビドン、ミリスチン酸オクチルドデシルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

ワンポイント情報



皮膚病には種々の原因がありますが、その治療の基本は皮膚を清潔にし、適切なお薬を用いることです。間違ったお薬を用いると、症状を悪化させることがありますので注意が必要です。

患部にかゆみがあっても、かきむしらないで下さい。かきむしると皮膚を傷つけ、細菌感染などを引き起こし、症状の悪化や新たな皮膚病を誘発する原因となります。

また、軟膏やクリームなどの皮膚外用薬を使用するときは、まず手を石鹸などできれいに洗ってから、塗るようにして下さい。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し祝日を除く)



ワクナガ

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

IHP5