

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

かぜの諸症状の緩和に 総合かぜ薬

第2類医薬品



製品の特徴

ワクナガフジコールWは、かぜの引きはじめにすぐれた効きめをあらわす「葛根湯」のエキスを、かぜによる種々の不快な諸症状を緩和する成分5種類を配合した総合かぜ薬です。
お子様から大人まで服用できるのみやすい散剤で、持ち運びにも便利なスティック包装のかぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 1. 次の人**は服用しないでください。**
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 2. 本剤を服用している間は、次の**いずれの医薬品も使用しないでください。**
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作を**しないでください。**
(眠気等があらわれることがあります。)
- 4. 服用前後は飲酒**しないでください。**
- 5. 長期連用**しないでください。**



相談すること

- 1. 次の人**は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 2. 服用後、次の**症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症※	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない※等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害※	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。※
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 3. 服用後、次の**症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**
□のかわき、眠気
- 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状(悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

1 回下記量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 包	3 回
11才以上15才未満	2 / 3 包	
7才以上11才未満	1 / 2 包	
3才以上7才未満	1 / 3 包	
1才以上3才未満	1 / 4 包	
1才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分 量 (3包(5,400mg)中)	は た ら き
アセトアミノフェン	500mg	熱を下げ、頭痛や関節の痛み、のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
チペピジンヒベンズ酸塩	75mg	せきをしずめると共に、たんもきれやすくします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	150mg	たんをうすめて、きれやすくします。
無水カフェイン	90mg	頭痛をやわらげます。
葛根湯乾燥エキス	1,500mg	ゾクゾクと寒気(悪寒)を感じるようなかぜの初期症状によく効きます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸A₁、白糖を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1 包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。



●ワンポイント情報

かぜは、からだの抵抗力が低下した時に起こりやすい急性炎症の一種です。
“かぜは万病のもと”といわれるように、長引かせると、体力を消耗し悪循環を起こし、いろいろな病気の原因にもなります。栄養/バランスのよい食事を心がけ、十分な睡眠をとり、からだの抵抗力の回復を助けて、長引かせないようにすることが大切です。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/