

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

ワダカルシウム®エース

Wada Calcium Ace

第2類医薬品

カルシウム剤 ビタミンD₃・マグネシウム配合

特 徴

- 1日1回、4錠の服用で610mgのカルシウムが補給できます。
- カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃や、カルシウムの代謝に必要なマグネシウムを配合しています。
- 有効成分のカルシウムは鉱物由来の原料を使用しています。
- カルシウムが必要な妊娠・授乳期のお母さんや加齢にともなうカルシウムの吸収が衰えがちな方などにも適しています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

医師の治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、悪心・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能・効 果

- 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

*腺病質とは、体格が貧弱で、貧血気味の虚弱で神経質な体質をいいます。

用 法・用 量

次の量を、服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服用回数
成人（15 歳以上）	4 錠	1 回
7 歳以上 15 歳未満	2 錠	1 回
7 歳未満	服用しないこと	

[用法・用量に関する注意]

用法・用量を守ってください。

成分・分量

成 分	分量（4錠中）
沈降炭酸カルシウム*1	1,525mg（カルシウムとして610mg）
炭酸マグネシウム*2	118.4mg（マグネシウムとして30mg）
コレカルシフェロール （ビタミンD ₃ ）*3	10μg（400I.U.）

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ゼラチン、硬化油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノラウリン酸ソルピタン、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、白糖を含有する。

*1: 骨や歯を作るのに大切なカルシウムを補給します。

*2: カルシウムと共に骨や歯を作り、カルシウムの代謝を維持します。

*3: 腸からのカルシウムの吸収を助けます。骨への沈着を促し、骨を丈夫にします。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化するおそれがあります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、開封後は捨ててください。
- (6) 水分が錠剤につくと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください。
- (7) 開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (8) 錠剤表面の微褐色球形斑点は成分のビタミンD₃によるものです。

*

お問合せ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ワダカルシウム製薬株式会社 お客様相談窓口

〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-17

電話：06-6766-4810（土・日・祝日を除く）

受付時間：10時～12時／13時～17時

*



ワダカルシウム製薬株式会社

〒534-0024

大阪市都島区東野田町 4-1-17