



服用前に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する
内服薬等(鼻炎用内服薬、車酔い酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、果物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 過量服用・長期連用しないこと

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる。全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用すること

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	2／3包	
7才以上11才未満	1／2包	
3才以上7才未満	1／3包	
1才以上3才未満	1／4包	
1才未満	服用しないこと	

用法及び用量に関する注意

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

24包 8日分

かぜの諸症状の緩和に

ピラコールゴールド[®] 顆粒

第②類医薬品

開け口

セルフメディケーション 税 控除 対象

24包 8日分

かぜの諸症状の緩和に

生薬 ケイヒ末 含有

発熱・悪寒

くしゃみ・鼻水・鼻づまり

のどの痛み・せき・たん

総合かぜ薬 2種の解熱鎮痛成分アセトアミノフェン＋エテンザミド配合

ピラコールゴールド[®] 顆粒

第②類医薬品

紙 : 箱

袋 : 袋

使用期限

製造番号

【発売元】ノーエチ薬品株式会社
大阪府松原市高見の里 4-8-16
【製造発売元】御所薬舗株式会社
奈良県御所市 1207 番地

お客様相談窓口
御所薬舗株式会社
0745-62-3388(9:00~17:00)
月～金(土・日・祝日を除く)

要 確認

4 975687 016407

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売名:ピラコールゴールド顆粒
第②類医薬品 24包

成 分 3包(3600mg)中

成 分	分 量
アセトアミノフェン	720mg
エテンザミド	300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
ノスカピン	48mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
カフェイン	120mg

添加物として、ケイヒ末、グリチルリチン酸二カリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、パレイショデンブ、法定色素を含む

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

品 名	ピラコールゴールド顆粒 24包 ケース	制 作 日	2026.9.11	MC	河原	色	スミ	C	M	Y	コンアイ	トラップ
本コード	0000-0000-00	校	作業者印	AC	河原	調	水性プレス				PAN2935	()
仮コード	1492E06128041	3 校	河原	P #	河原	朝日印刷株式会社	vdh49	APP.MA				角度

水性プレス版1492-0046-30と兼用 175線