

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
● 医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、食べ過ぎ、食欲不振（食欲減退）、胃弱、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（30mL）を食後服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 生薬成分を含むため、わずかに沈殿を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用すること。

AL04

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

金 属：キャップ ガラス：瓶

30mL
¥400+税

**胃弱、消化不良、はきけ
（二日酔・悪酔のむかつき）**

薬草健胃薬

**内服液
30mL**

第3類医薬品

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50
〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除く）

【成分・分量】1日量1本（30mL）中

オウバクエキス…100mg（オウバク300mgに相当）、ケイヒエキス…45mg（ケイヒ1000mgに相当）、ウイキョウエキス…31.5mg（ウイキョウ300mgに相当）、カンゾウエキス…200mg（カンゾウ800mgに相当）、ニンジンエキス…60mg（ニンジン667mgに相当）、ショウキョウエキス…58.2mg（ショウキョウ600mgに相当） 添加物：ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、トメントール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、バニリン

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

使用
期限

製造
番号