

トチモトのマクリP

医薬品

日本薬局方

マクリ

10g〈1日分〉

海人草



TOCHIMOTO

株式会社 杉本天海堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425



トチモトのマクリP

日本標準商品分類番号	
8751	
薬効分類	生薬

本品はマクリDigenea simplex C.Agardh(Rhodomelaceae)の全藻である。

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の駆虫薬、ヒマシ油
2. 3回以上続けて服用しないで下さい。
なお、再度駆虫を必要とする場合は、1カ月以上の間隔をおいて下さい。

ワタ

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (4) 次の診断を受けた人。 肝臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃痛、腹痛、悪心・嘔吐
精神神経系	頭痛、めまい

(2) 効果がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 □のかわき

【成分・分量】本品1日量(10g)中 日本薬局方マクリ10g

【効能・効果】回虫の駆除

【用法・用量】大人(15歳以上)は、1日量10gを水約100mlをもって煮て約60mlに煮つめ、
かすをしぼって取り去り、1日1～2回、空腹時に服用して下さい。

- (1) 本剤は、劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- (3) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすを取って下さい。
- (4) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。
- (5) 便秘症の人は本剤服用後、虫を排泄するため、適宜瀉下薬を用いることが望ましいです。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷蔵所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- (5) 生薬を原料として製造しているため、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でも
お取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃木天海堂 D1室
〒530-0053 大阪市北区末広町3番21号
電話番号:06(6312)8425
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

Lot.No.

