



販売名：ニューアンメルツヨコヨコA
External Anti-Inflammatory/ Analgesic

第3類医薬品 外用鎮痛消炎剤

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

特 徴

- ① ジンジンという温かい感覚が、血行促進の作用のサイン!
- ② 2種類の血行促進成分(ノナン酸βニリルアミド・ニコチン酸ベンジルエステル)と鎮痛成分(サリチル酸グリコール)を配合し、肩こりを原因※から改善します
※肩こりの原因の一つである血行不良
- ③ 手が汚れず使いやすいヨコヨコボトルです

■ 成分・分量100mL中 ■

サリチル酸グリコール 2500mg
メントール 3000mg
クロルフェナミンマレイン酸塩 100mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
ノナン酸βニリルアミド 12mg
添加物として、プロピレングリコール、エタノール、ハセセシルし糖を含有する

■ 用法・用量 ■

1日数回患部に適量を塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
 - 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
 - 皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと
 - スポーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要に応じて読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

■ 効能・効果 ■

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

■ 保管及び取扱上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
 - キャップをしっかりとめないで液がもれることがある
 - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗家具、床等)、皮革等に液がつくと損傷したり、シミになることがあるので注意すること

製品の問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都業生北4-46

税 控除対象

MADE IN JAPAN