



アラントイン配合

新ロート目薬

パソコン・ワープロ、テレビに読書…。近年目を酷使する機会がますます増え、目の疲れに悩む方が増えています。また、スマogやホコリなどで汚れた空気の刺激で目に小さな傷ができ、炎症や充血を起こすこともたびたびです。新ロート目薬は、炎症を抑える成分や目の調節機能を高める成分の配合で、疲れ・充血・かゆみなどの不快症状を取り除き、大切な目を健やかに保ちます。

新ロート目薬の特長

- ①アラントインには抗炎症作用や目の傷の治りを助ける作用があり、外からの刺激にさらされて傷みがちな目に働き、炎症をしのぐとともに眼病を予防します。
- ②ネオスチグミンメチル硫酸塩は目の調節機能を回復させる働きがあり、目の疲れにすぐれた効果を発揮します。
- ③硫酸亜鉛水和物はすぐれた消炎作用を持っていますので、炎症によって起こる充血やかゆみを和らげます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人:はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人:緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにが多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。



容器の先と
目やまぶたが
ふれることのないように

(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4) 点眼用にのみ使用してください。

有効成分

有効成分	配合量
アラントイン	0.1%
硫酸亜鉛水和物	0.1%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.002%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、L-アスパラギン酸Mg、L-アスパラギン酸K、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、l-メントール、ポリソルベート80、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、
高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。



(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)



(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせ先: お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)