

医薬品

トチモトの 温 経 湯

うん けい とう

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなるため)
次の人は服用しないで下さい。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、 手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。

【成分・分量】 1日量(1包・27g中)

日本薬局方カンゾウ	2.0g	日本薬局方ショウキョウ	1.0g	日本薬局方バクモンドウ	4.0g
日本薬局方ケイヒ	2.0g	日本薬局方センキュウ	2.0g	日本薬局方ハシゲ	4.0g
日本薬局方ゴシュユ	1.0g	日本薬局方トウキ	3.0g	日本薬局方ボタンピ	2.0g
日本薬局方ジャクヤク	2.0g	日本薬局方ニンジン	2.0g	局外生規アキョウ	2.0g

【効能・効果】 手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、
湿疹、足腰の冷え、しもやけ

【用法・用量】 大人(15歳以上)は、本品1日1包を紙袋入りのまま、水約500mlを加え、半量ぐらいまで煎じつめ、紙袋とともに煎じかすを
除き、煎液を3回に分けて食間に服用して下さい。

15歳未満	7歳以上	大人の2/3	4歳未満	2歳以上	大人の1/3
7歳未満	4歳以上	大人の1/2	2歳未満		大人の1/4以下を服用する。

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないで下さい。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、
食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃本天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)