

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の香蘇散料エキス顆粒

(こうそさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、中国の宋時代（約1000年前）の古典「太平惠民和剂局方」に収載されている香蘇散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(かぜの初期)に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。(500g商品の場合:添付のサジはすり切り約1.0gです。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数	年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15才以上)	1 包または1.50 g	3 回	7 才未満 4 才以上	1/2包または0.75 g	3 回
15才未満 7 才以上	2/3包または1.00 g		4 才未満 2 才以上	1/3包または0.50 g	
			2 才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量4.5g又は3包(1包1.5g)中]

日本薬局方	コ	ウ	ブ	シ	1.05g	日本薬局方	コ	ウ	ブ	シ	末	1.4g
日本薬局方	ソ	ヨ	ウ		0.45g	別紙規格	ソ	ヨ	ウ	末		0.6g
日本薬局方	チ	ン	ピ		0.90g	局外生規	チ	ン	ピ	末		1.2g
日本薬局方	カ	ン	ゾ	ウ	0.30g	日本薬局方	カ	ン	ゾ	ウ	末	0.4g
日本薬局方	シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ	末					0.4g
より製した水製乾燥エキス												0.5g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号