

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

# 「モリ」サイボン

(柴朴湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特徴

「モリ」サイボンは、柴朴湯（さいぼくとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体力は普通か、または普通よりやや虚弱で、あまり衰弱していない人で、のどや食道部にいつも何かがひっかかるようになったとか、詰まったような違和感があり、いつ発作が起こるか心配な人の気管支ぜんそくや小児ぜんそく、また、いつも気分がふさいで心配性の不安神経症に効果があります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症：

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体质

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2~3時間指します)

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### 用法及び用量に関する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包（1包1.5g）中に、次の生薬から抽出された柴朴湯エキス（1/2量）2.5gが含まれています。

サイコ（柴胡）	3.5g	ニンジン（人参）	1.5g
ハンゲ（半夏）	2.5g	コウボク（厚朴）	1.5g
ショウキョウ（生姜）	0.5g	カンゾウ（甘草）	1.0g
オウゴン（黄芩）	1.5g	ソヨウ（蘇葉）	1.0g
タイソウ（大棗）	1.5g	ブクリョウ（茯苓）	2.5g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話（06）6629-9058

受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2