

生薬製剤 販売名:強活腎散 第2類医薬品 1.5g×75包

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 膀胱カタル、腎臓病、腰痛、高血圧、糖尿病、脚気、早漏、陰萎

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
10歳以上15歳未満	2/3包	
5歳以上10歳未満	1/2包	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【成分・分量】1日量3包(4.5g)中

サンヤク……737.7mg } エキス ……3.437mL
タクシャ ……184.4mg } (固形物として73.8mg)
ケイヒ末……170.0mg
サンヤク末…680.2mg
ソウジュツ末……1.7mg
タクシャ末…510.1mg
ブクリョウ末…510.1mg
ボタンピ末…510.1mg
サンシュユ末…680.2mg
ジオウ末…1360.4mg
ニンジン末……1.7mg
チンピ末……1.7mg

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【お問い合わせ・発売元】

ルソイル 真漢方堂

【薬店名】真漢方堂

福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

☎0120-531-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

剂盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号