

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

へん
扁せき
鵲

(生薬製剤)

◆「扁鵲」は脂肪過多症を改善するために、11種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の医薬品を服用している人。

便秘薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐
そ の 他	むくみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包	3回
7~15歳	成人の1/2量	
7歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後2~3時間指
します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。

タクシャ末	0.86g	ダイオウ末	0.43g
ショウキヨウ末	0.43g	カンゾウ末	0.43g
ケイヒ末	0.43g	シャクヤク末	0.43g
ボタンピ末	0.43g	チョレイ末	0.86g
サイコ末	0.86g	ハンゲ末	0.43g
ショウマ末	0.43g		

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやしそうかくどう
株式会社 建林松鶴堂
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7