

【成分・分量】1日量1本(100mL)中  
チアミン塩化物……………10mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム…3mg  
ピリドキシン塩酸塩……………10mg  
ニコチン酸アミド……………10mg  
無水カフェイン……………50mg  
タウリン……………2000mg

L-アスパラギン酸  
マグネシウム・カリウム……………200mg  
黄精流エキス……………0.1mL

(オウセイ100mgに相当)  
添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、エタノール、香料、エチルパニリン、L-メントール、グリセリン、パニリン、プロピレングリコール

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

●用法・用量を厳守すること(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

製造販売元

TL05

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

滋養強壮・虚弱体質  
肉体疲労時の栄養補給に

100mL

タウリン  
2000mg

L-アスパラギン酸  
Mg・K

生薬  
黄精流エキス

ソキセー  
2000

指定医薬部外品

【使用上の注意】

#### 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

#### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、  
肉体疲労、病中病後、  
食欲不振、栄養障害、  
発熱性消耗性疾患、産  
前産後などの場合の栄養  
補給。


#### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号



ソキセー-2000