

救風

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	
製品名	救風
製品名（読み）	キュウフウ
製品の特徴	かぜの諸症状には、発熱、悪寒、頭痛、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛みがあります。救風は、これらの症状に効果がある漢方処方である葛根湯を主成分とし、さらに非ピリン系解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤などを配合した総合かぜ薬です。かぜの初期症状や、関節・筋肉の痛みに効果をあらわします。 特長 ●漢方処方「葛根湯乾燥エキス」を配合 ●「漢方薬＋西洋薬」の漢洋ミックス処方 ●かぜのひきはじめに効果的
使用上の注意	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります） - 次の人は服用しないでください - 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など） - 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください （眠気などがあらわれることがあります。） - 服用前後は飲酒しないでください - 長期連用しないでください ■相談すること - 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください - 医師または歯科医師の治療を受けている人。 - 妊婦または妊娠していると思われる人。 - 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。 - 高齢者。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難

	(7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 〔関係部位：症状〕 皮ふ：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系：めまい 泌尿器：排尿困難 その他：過度の体温低下 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 〔症状の名称：症状〕 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、※<u>多形紅斑</u>：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤、※<u>水疱が皮ふの赤い部分にあらわれる</u>などが持続したり、急激に悪化する。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。 間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。 再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿などがあらわれる。 無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 口のかわき、眠気 4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
効能関連注意	
用法・用量	食後なるべく30分以内に服用してください。 〔年齢：1回量：1日服用回数〕

	成人（15才以上）：1包：3回 11才以上15才未満：2／3包：3回 7才以上11才未満：1／2包：3回 3才以上7才未満：1／3包：3回 3才未満：服用しないでください。																		
用法関連注意	(1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。																		
成分分量	3包(4.65g)中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th><th>内訳</th></tr><tr><td>葛根湯乾燥エキス（原生薬換算量9g）</td><td>1500mg</td><td>（カッコン2.88g，マオウ・タイソウ各1.44g，ショウキョウ0.36g，ケイヒ・シャクヤク各1.08g，カンゾウ0.72g）</td></tr><tr><td>エテンザミド</td><td>960mg</td><td></td></tr><tr><td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td><td></td></tr><tr><td>チペピジンヒベンズ酸塩</td><td>60mg</td><td></td></tr><tr><td>無水カフェイン</td><td>150mg</td><td></td></tr></table>	成分	分量	内訳	葛根湯乾燥エキス（原生薬換算量9g）	1500mg	（カッコン2.88g，マオウ・タイソウ各1.44g，ショウキョウ0.36g，ケイヒ・シャクヤク各1.08g，カンゾウ0.72g）	エテンザミド	960mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		チペピジンヒベンズ酸塩	60mg		無水カフェイン	150mg	
成分	分量	内訳																	
葛根湯乾燥エキス（原生薬換算量9g）	1500mg	（カッコン2.88g，マオウ・タイソウ各1.44g，ショウキョウ0.36g，ケイヒ・シャクヤク各1.08g，カンゾウ0.72g）																	
エテンザミド	960mg																		
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																		
チペピジンヒベンズ酸塩	60mg																		
無水カフェイン	150mg																		
添加物	乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース																		
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。） (4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。																		
消費者相談窓口	会社名：常盤薬品工業株式会社 住所：神戸市中央区港島中町6-13-1 電話：0120-875-710																		
製造販売会社	常盤薬品工業株式会社 添付文書情報 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5																		
販売会社																			
剤形	散剤																		
リスク区分等	第「2」類医薬品																		