

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第②類医薬品
便秘治療薬

ファイブアスペンタイワ

植物性センイ（プランタゴ・オバタ種皮末）配合

ファイブアスペンタイワは、プランタゴ・オバタ種皮末が水分を吸収し相当の量に膨らんで作用を発揮し、センナ実末は腸の運動を促進します。両者の働きにより、排便を促し腸内の宿便の除去が期待できます。また、シャクヤク、カンゾウの組み合わせは腹痛を和らげる効果があると言われています。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、こ
の文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること

【効能又は効果】

- ・便秘
- ・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、
食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

【用法及び用量】

次の量を朝夕の空腹時（又は食前あるいは食間）にコップ1杯以上
の水又はお湯でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用
い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	1～1.5包（1包半）	2回
小児（15歳未満）	服用しないこと	

◎用法及び用量に関連する注意

プラタゴ・オバタ種皮末は、水分を吸収し膨潤しますので、必ず
コップ一杯以上の水又はお湯で服用してください。

【成分及び分量】

1日量（3包＝10,000mg）中

プラタゴ・オバタ種皮末4,500mg
センナ実末1,500mg
シャクヤク末750mg
カンゾウ末750mg
添加物としてバレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、
酸化チタン、プロピレングリコール、香料及び三酸化鉄を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

【問い合わせ先】

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25

電話 0745-22-4151

受付時間／9：00～16：00（土・日・祝日を除く）

発 売 元



大和製薬株式会社

富山県富山市水橋二杉1-2

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25